

**ASUHAN KEBIDANAN KOMPERHENSIF PADA PEREMPUAN
“HE” DI PMB “PA” WILAYAH KERJA PUSKESMAS BULELENG II
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022**

Oleh

Komang Sri Diantari

NIM. 1906091050

ABSTRAK

Sering kencing adalah salah satu ketidaknyamanan yang masih banyak dialami oleh sebagian besar perempuan hamil trimester III, apabila sering kencing tidak ditangani dengan tepat akan berpengaruh dengan proses persalinan dan masa nifas. Maka dari itu, dilakukan asuhan yang komprehensif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Hasil yang di dapat adalah Ibu hamil “HE” G2P1A0 UK 37 Minggu 4 Hari Preskep U Puki Janin Tunggal Hidup Intra Uteri pada masa kehamilan trimester III mengalami sering kencing. Pada saat persalinan mengalami keluhan sakit perut hilang timbul dan keluar lendir campur darah. Proses kala I, kala II, kala III berlangsung dengan normal dan dilakukan pemantauan kala IV hingga 2 jam post partum, penatalaksanaan yang dilakukan kala I fase aktif yaitu pemantauan dengan menggunakan partograf WHO, kala II dilakukan sesuai dengan APN, kala III dilakukan sesuai dengan manajemen aktif kala III dan pada kala IV dilakukan pemantauan sampai 2 jam post partum. Asuhan pada masa nifas dimulai dari KF 1 yaitu nifas 12 jam, KF 2 yaitu nifas hari ke-7, KF 3 nifas hari ke-18. Penatalaksanaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kunjungan nifas. Pada bayi perempuan “HE” dilakukan penatalaksanaan KN 1 berusia 12 jam, KN 2 berusia 7 hari tidak ada keluhan pada bayi, KN 3 berusia 18 hari dan bayi tidak ada keluhan. Penatalaksanaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kunjungan neonatus. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus tersebut yaitu tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan aktualisasi di lapangan pada saat pelaksanaan asuhan.

Kata Kunci : Trimester III, Sering kencing

**COMPREHENSIVE MIDWIFE CARE FOR WOMEN "HE" IN PMB "PA"
WORKING AREA OF BULELENG PUBLIC HEALTH CENTER II
BULELENG DISTRICT IN 2022**

By

Komang Sri Diantari

NIM. 1906091050

ABSTRACT

Most of the pregnant women in the third trimester, if frequent urination is not handled properly it will affect the delivery process and the puerperium. Therefore, comprehensive care is carried out. This type of research is descriptive with a case study approach. Data was collected by interview, observation, physical examination, and documentation methods. The results obtained were pregnant women "HE" G2P1A0 UK 37 Weeks 4 Days Preskeptic U Puki Single Fetus Live Intra Uterine during the third trimester of pregnancy experienced frequent urination. At the time of delivery, she complained of intermittent abdominal pain and mucus mixed with blood. The process of stage I, stage II, stage III takes place normally and stage IV is monitored for up to 2 hours post partum, the management is carried out in the first stage of active phase, namely monitoring using the WHO partograph, stage II is carried out according to APN, stage III is carried out according to management active stage III and in stage IV monitoring until 2 hours post partum. Care during the puerperium starts from KF 1, which is 12 hours postpartum, KF 2, which is the 7th day of postpartum, KF 3 on the 18th day of postpartum. Management is given according to the needs and in accordance with the postpartum visit. The baby girl "HE" was treated for KN 1 aged 12 hours, KN 2 was 7 days old, there were no complaints in the baby, KN 3 was 18 days old and the baby had no complaints. The management is given according to the needs and according to the neonate's visit. The conclusion that can be drawn from this case is that there is no gap between theory and actualization in the field during the implementation of maternal care.

Keywords: Third Trimester, Frequent urination