

**“ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA PEREMPUAN “MS” DI
PMB “AP” WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANJAR I KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2022”**

Oleh
Kadek Ratih Kartika Sari

NIM.1906091045

ABSTRAK

Setiap kehamilan sering terjadinya perubahan fisik ataupun psikologis terutama pada trimester III salah satunya yaitu sering kencing. Sering kencing terjadi pada ibu hamil disebabkan oleh janin yang semakin membesar yang menyebabkan penekanan pada kandung kemih sehingga menyebabkan selalu ingin berkemih. Jika tidak segera diatasi dapat mengganggu kenyamanan ibu hamil. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada perempuan “MS” mulai dari usia kehamilan 36 minggu, bersalin, bayi baru lahir sampai nifas 2 minggu. Pada laporan tugas akhir ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi dan studi kasus. Dilaksanakan pada tanggal 7 Februari s.d 25 April 2022 dengan subjek penelitian yaitu Perempuan “MS” G3P2A0 UK 37 minggu 4 hari yang diberikan asuhan dari usia kehamilan 36 minggu sampai dengan nifas 14 hari. Analisa kehamilan G3P2A0 UK 37 minggu 4 hari preskepuji janin tunggal hidup intra uteri, analisa persalinan G3P2A0 UK 39 minggu 6 hari preskepuji janin tunggal hidup intra uteri partus kala II, analisa nifas P3A0 partus spontan belakang kepala dengan laserasi *grade I*. Penatalaksanaan pada kunjungan pertama didapatkan hasil ibu mengeluh sering kencing dan sudah diberikan komunikasi, informasi dan edukasi cara mengatasi sering kencing dengan melakukan senam kegel serta mengurangi minum pada malam hari. Pada proses persalinan yaitu spontan belakang kepala dengan kala I berlangsung selama 2 jam, kala II berlangsung 30 menit, kala III berlangsung selama 10 menit, kala IV dilakukan pemantauan dari setelah lahirnya plasenta sampai dengan 2 jam post partum. Pada kunjungan nifas ibu tidak ada keluhan dan tidak terdapat tanda bahaya masa nifas. Pada bayi baru lahir bayi diberikan salep mata dan Vit K dan tidak dilakukan inisiasi menyusui dini. Asuhan pada perempuan “MS” dengan keluhan sering kencing sudah dapat diatasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asuhan kebidanan komprehensif pada perempuan “MS” berjalan dengan lancar dan sesuai dengan asuhan berkesinambungan.

Kata Kunci : Kehamilan, Sering Kencing.

**“COMPREHENSIVE MIDWIFERY CARE FOR “MS” WOMEN AT PMB
“AP” IN THE WORK AREA OF THE BANJAR I PUBLIC HEALTH
CENTER, BULELENG REGENCY IN 2022”**

By

Kadek Ratih Kartika Sari

NIM.1906091045

ABSTRAC

Every pregnancy, there are often physical or psychological changes, especially in the third trimester, one of which is frequent urination. Frequent urination occurs in pregnant women due to the growing fetus which causes pressure on the bladder, causing the urge to urinate all the time. If not addressed immediately can interfere with the comfort of pregnant women. The purpose of this study was to provide comprehensive midwifery care for “MS” women starting from 36 weeks of gestation, childbirth, newborns to 2 weeks postpartum. In this final report, the type of research used is descriptive method with a case study approach. Data were collected using interviews, observation, physical examination, documentation and case studies. It was held from 7 February to 25 April 2022 with the research subject being "MS" G3P2A0 UK 37 weeks 4 days women who were given care from 36 weeks gestation to 14 days postpartum. Analysis of pregnancy G3P2A0 UK 37 weeks 4 days presupposition of single live intrauterine fetus, analysis of labor G3P2A0 UK 39 weeks 6 days presupposition of single live fetus in intrauterine stage II parturition, analysis of postpartum P3A0 spontaneous parturition behind the head with grade I laceration. Management on the first visit, the results showed that the mother complained of frequent urination and had been given communication, information and education on how to overcome frequent urination by doing Kegel exercises and reducing drinking at night. In the delivery process, namely spontaneous behind the head with the first stage lasting for 2 hours, the second stage lasting 30 minutes, the third stage lasting 10 minutes, the fourth stage being monitored from after the birth of the placenta to 2 hours post partum. At the postpartum visit, the mother had no complaints and there were no danger signs during the puerperium. Newborns were given eye ointment and Vitamin K and no early initiation of breastfeeding was carried out. The care for "MS" women with complaints of frequent urination has been resolved. Thus, it can be concluded that comprehensive midwifery care for “MS” women runs smoothly and in accordance with continuous care.

Keyword : Pregnancy, Frequent Urination