


ABSTRAK

Sakit punggung bagian bawah merupakan ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu hamil terutama pada trimester III. Keluhan sakit punggung bagian bawah ini disebabkan karena tulang yang berfungsi menopang tubuh ibu mengalami gangguan seiring bertambahnya berat badan yang sesuai dengan usia kehamilan ibu. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif (*Continuity of Care*) pada perempuan “LA” mulai UK 38 minggu 1 hari , bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Hasil yang di dapat pada Perempuan “LA” G1P0A0 UK 38 Minggu 1 Hari Preskep \cup Puka Janin Tunggal Hidup Intra Uteri dengan keluhan sakit punggung bagian bawah. Asuhan kebidanan secara komprehensif pada perempuan “LA”, selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas ibu harus mendapatkan asuhan pemeriksaan standar 10 T, selama masa kehamilan trimester III dengan keluhan sakit punggung bagian bawah tidak ditemukan adanya komplikasi, tidak terdapat kesenjangan selama pemeriksaan ANC ibu, pada persalina dari kala I-IV berlangsung secara normal dan pemantauan dengan menggunakan partograf, terdapat kesenjangan pada kala II karena tidak melakukan pengecekan lilitan tali pusat dan sangga susur, pada bayi tidak ada masalah namun terdapat kesenjangan pada perawatan tali pusat yang masih membungkus dengan kasa, masa nifas berlangsung secara fisiologis. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus ini yaitu masih terdapat kesenjangan antara teori dan aktualisasi dilapangan sehingga untuk kedepannya diharapkan bidan dapat meningkatkan asuhan secara komprehensif untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Ibu Hamil Trimester III, Sakit Punggung, Asuhan Berkesinambungan



ABSTRACT

Lower back pain is a discomfort experienced by pregnant women, especially in the third trimester. Complaints of lower back pain are caused because the bones that function to support the mother's body are disrupted as the body weight increases according to the mother's gestational age. This study aimed to provide comprehensive midwifery care (Continuity of Care) for "LA" women from the UK 38 weeks 1 day, childbirth, postpartum, and newborns. Methods of data collection are done using interviews, observation, physical examination, and documentation. The results obtained were "LA" G1P0A0 UK 38 Week 1 Day Preskep ♀ Puka Single Fetus Living Intra Uterine with complaints of lower back pain. Comprehensive midwifery care for "LA" women, during pregnancy, childbirth, and postpartum the mother must receive standard 10 T care, during the third trimester of pregnancy with complaints of lower back pain no complications were found, there were no gaps during the mother's ANC examination, during childbirth from stages I-IV proceeded normally and monitoring using a partograph, there was a gap in stage II because no checks were made on the umbilical cord and the support of the umbilical cord, the baby had no problems but there were gaps in the care of the umbilical cord which was still wrapped with gauze, the postpartum period was ongoing physiologically. The conclusion that can be drawn from this case is that there is still a gap between theory and actualization in the field so in the future, it is hoped that midwives can improve comprehensive care to improve the quality of health services.

Keywords: *Third Trimester Pregnant Women, Back Pain, Continuity of Care*

