

ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA PEREMPUAN “AM” DI PMB “LW” WILAYAH KERJA PUSKESMAS BUSUNGBIU I TAHUN 2023

Kadek Rahayu Kurnia Lestari

Sering buang air kecil adalah salah satu ketidaknyaman yang sering dirasakan oleh ibu hamil trimester III karena adanya perubahan fisiologis yang membuat ibu hamil menjadi lebih sering buang air kecil (Dewi & Sunarsih dalam Megasari, 2019). Jika tidak diatasi dengan baik, keluhan sering buang air kecil dapat memicu faktor risiko pada ibu selama masa kehamilan hingga nifas bahkan pada bayi. Maka dari itu, dilakukan asuhan komprehensif yang bertujuan untuk memantau dan mendeteksi adanya kemungkinan timbul komplikasi melalui pemberian asuhan secara berkesinambungan pada ibu dan bayi. Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret sampai dengan 10 Mei 2023, pada Perempuan “AM” dari usia kehamilan 37 minggu 5 hari sampai nifas 2 minggu pertama yang bertempat di Praktik Mandiri Bidan “LW”. Pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan anamnesa/wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dapat, pada kunjungan pertama di trimester III ibu mengeluh sering buang air kecil namun keluhan yang dirasakan ibu sudah berkurang karena telah menerapkan KIE yang diberikan yakni dengan lebih banyak minum di siang hari dan mengurangi minum di malam hari, menghindari minuman berkafein dan tidak menahan kencing serta memastikan untuk mengosongkan kandung kemih saat kencing. Ibu bersalin dengan normal, ditolong oleh bidan. Pada saat persalinan, di kala II persalinan tidak dilakukan pemeriksaan kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan dilakukan tindakan hisap lendir menggunakan delee saat setelah bayi lahir walau bayi menangis dan dapat bernafas secara spontan. Selama masa nifas, baik ibu maupun bayi telah mendapatkan asuhan yang sesuai, hasil pemeriksaan ibu dan bayi dalam batas normal dan tidak terdapat komplikasi pada ibu maupun bayi. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pada Pr “AM” sejak kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir dalam batas normal walau ada beberapa kesenjangan pada asuhan yang diberikan saat menolong persalinan. Dengan demikian, simpulan yang dapat ditarik dari kasus tersebut yaitu ada beberapa kesenjangan antara teori dengan aktual dilapangan.

Kata Kunci : Ketidaknyamanan, Sering Buang Air Kecil, Asuhan Komprehensif

ABSTRACT

THE COMPREHENSIVE MIDWIFERY CARE ON A WOMAN INITIAL “AM” IN THE OBSTETRIC PRACTICE OF “LW” WITHIN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS BUSUNGBIU I YEAR 2023

Kadek Rahayu Kurnia Lestari

Urinating frequently results in inconvenience for pregnant women in their trimester III because of physiological changes experienced by the kidneys which work harder in filtering and producing more urine as well as the growing fetus and placenta as the gestational age increases which puts pressure on the bladder (Dewi & Sunarsih in Megasari, 2019). If the symptom does not overcome, complaints of frequent urination might trigger risk for the mother during pregnancy to childbirth and even in infants. Therefore, comprehensive care must be conducted aiming at observing and detecting possibilities of complication by giving sustainable care for the mother and the baby. This final report was composed using descriptive research type with case study methodology that was conducted on the 6th of March to the 10th of May 2023, on a woman initial "AM" from the gestational age of 37 weeks 5 days to the first two weeks of childbirth, located in the obstetric practice of "LW". The data collection was conducted by anamnesis/interview, observation, physical check-up, and documentation study. The research results revealed that on the first visit, the mother complained about frequent urination, but had given communication, information, and education regarding the symptom, such as drinking more water at noon and drinking less water at night, avoiding caffeinated drink and not holding urination, as well as make sure to empty the bladder when urinating. The mother gave normal childbirth, assisted by a midwife. During childbirth, on the stage II was not conducted nuchal cord checking possibilities and suctioning by using delee when the baby just born even she/he cried and able to breathe spontaneously. During the childbed, the mother and the baby already had given proper care, the checking result of the mother and the baby was within normal and there was no complication on both. Overall, the check-up result on Pr 'AM' since the pregnancy, childbirth, childbed, and newborn were on normal boundaries even there were gaps found during the childbirth care. In conclusion, there are several gaps found between theories and actual practice on the field.

Keywords: Inconvenience, Frequent Urination, Comprehensive Care