

ABSTRAK

Ketidaknyamanan yang dialami ibu hamil salah satunya adalah sering kencing. Apabila keluhan sering kencing tidak diatasi dapat mengakibatkan terjadinya disuria dan oliguria, selain itu yang terjadi akibat sering kencing yaitu dapat menyebabkan iritasi dan memicu terjadinya infeksi saluran kemih. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan asuhan kebidanan komprehensif pada perempuan “LS” di PMB “MI” Wilayah Kerja Puskesmas Sawan I. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dimulai dari usia kehamilan 36 minggu 1 hari sampai dengan nifas hari ke-14 (KF 3). Hasil penelitian asuhan kebidanan pada perempuan “LS” yang mengalami sering kencing sudah berkurang dengan memberikan informasi penyebab dan cara mengatasi keluhan sering kencing. Pada data subjektif ibu mengatakan sering kencing sudah berkurang. Data objektif pada pemeriksaan fisik dalam batas normal. Analisis kehamilan G2P1A0 UK 36 minggu 1 hari preskep \cup puki janin tunggal hidup intrauteri, pada persalinan G2P1A0 UK 38 minggu 4 hari preskep \cup puki janin tunggal hidup intrauteri partus kala 1 fase laten, pada saat nifas P2AO partus spontan belakang kepala nifas 2 jam. Penatalaksanaan yang diberikan yaitu memberi informasi mengenai pengertian, penyebab, dampak dan cara mengatasi sering kencing dan menolong kelahiran bayi sesuai APN. Asuhan pada bayi perempuan “LS” dapat dilakukan dengan baik, tidak terdapat penyulit, pada saat persalinan tidak dilakukan IMD. Kesimpulan dari asuhan kebidanan pada perempuan “LS” di PMB “MI” pada proses kehamilan, persalinan, nifas sudah berjalan secara fisiologis dan sudah terlaksana secara *Continuity Of Care*. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah menerapkan metode lain untuk mengatasi sering kencing selain memberi informasi mengenai pengertian, penyebab, dampak dan cara mengatasi sering kencing.

kata kunci : kebidanan komprehensif, sering kencing

ABSTRACT

One of the discomforts experienced by pregnant women is frequent urination. If complaints of frequent urination are not resolved it can result in dysuria and oliguria, besides that what occurs due to frequent urination can cause irritation and trigger urinary tract infections. The purpose of this study was to describe comprehensive midwifery care for women "LS" at PMB "MI" in the Work Area of the Sawan I Health Center. The research method used was descriptive research with a case study approach starting at 36 weeks 1 day of gestation up to the 14th day of childbirth. The results of research on midwifery care for women "LS" who experience frequent urination can be overcome by providing information on how to deal with frequent urination. In subjective data, the mother said that frequent urination could be overcome. Objective data on physical examination within normal limits. Analysis of pregnancy G2P1A0 gestational age 36 weeks 1 day preskep \cup left back single fetus alive intrauterine, at delivery G2P1A0 gestational age 38 weeks 4 days preskep \cup left back single fetus alive intrauterine parturition stage 1 latent phase, during puerperium P2A0 spontaneous parturition behind the head of the puerperium 2 hours. The management given is to provide information about the meaning, causes, effects and ways to deal with frequent urination and help deliver babies according to normal delivery care. Care for baby girls "LS" can be done well, there are no complications, at the time of delivery IMD was not done. The conclusion of midwifery care for women "LS" at PMB "MI" in the process of pregnancy, childbirth, postpartum has been running physiologically and has been carried out in a Continuity Of Care manner. Suggestions for future researchers are to apply other methods to deal with frequent urination in addition to providing information about the meaning, causes, effects and ways to deal with frequent urination.

Keywords : *Comprehensive midwifery care, frequent urination*