

ABSTRAK

Sering kencing adalah ketidaknyamanan yang banyak dialami oleh ibu hamil pada trimester III. Keluhan sering kencing ini akibat dari janin dan plasenta yang membesar juga memberikan tekanan pada kandung kemih. Tujuan penelitian ini untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif (*Continuity of Care*) pada perempuan “PL” di PMB “NW” Wilayah Kerja Puskesmas Busungbiu I. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu Perempuan “PL” G1P0A0 UK 36 Minggu Preskep Έ Puka Janin Tunggal Hidup Intrauteri dengan keluhan sering kencing. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pada asuhan kebidanan komprehensif yang diberikan pada perempuan “PL” sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari trimester III sampai 2 minggu masa nifas. Pada kehamilan ibu mengalami keluhan sering kencing dan sudah bisa teratasi dengan cara mengurangi minum pada malam hari, serta melakukan senam kegel. Pada persalinan Kala I-IV berjalan dengan normal tanpa ada penyulit, terdapat kesenjangan yaitu melakukan hisap lender pada saat bayi baru lahir dengan *delee* untuk memastikan apakah benar tidak ada lendir, tidak melakukan IMD karena ibu mengeluh lelah dan setelah diberikan motivasi ibu juga tidak mau melakukannya serta setelah ditanyakan kepada bidan memang tidak dilakukan. Pada masa nifas berjalan dengan baik dan normal, tidak ditemukannya tanda infeksi. Asuhan pada bayi baru lahir terdapat kesenjangan pada perawatan tali pusat yang masih membungkus dengan kasa dengan pertimbangan ibunya masih takut jika tali pusattidak dibungkus akan terkena kencing dan kotoran. Disarankan kepada bidan dapat meningkatkan asuhan secara komprehensif dalam melakukan pelayanan yang berkualitas bagi kesehatan ibu, anak dan masyarakat.

Kata Kunci : Sering Kencing, Ibu Hamil Trimester III, Continuity of Care(COC).

ABSTRACT

Frequent urination is a discomfort experienced by many pregnant women in the third trimester. Complaints of frequent urination are a result of the enlarged fetus and placenta also putting pressure on the bladder. The aim of this research is to provide comprehensive midwifery care (Continuity of Care) to "PL" women in the PMB "NW" Busungbiu I Community Health Center Work Area. Data collection was carried out using interview, observation, physical examination and documentation methods. The research subject was a woman "PL" G1P0A0 UK 36 weeks Preskep U with a single live intrauterine fetus with complaints of frequent urination. The results of this research show that the comprehensive midwifery care provided to "PL" women has been carried out according to needs from the third trimester to 2 weeks of the postpartum period. During pregnancy, mothers experience complaints of frequent urination and this can be resolved by reducing drinking at night and doing Kegel exercises. In Stages I-IV, labor proceeded normally without any complications, there were gaps, namely suctioning the mucus when the baby was born with delee to ensure that there really was no mucus, not doing IMD because the mother complained of being tired and after being given motivation the mother also didn't want to do it. and after asking the midwife it was not done. During the postpartum period everything went well and normally, there were no signs of infection. There is a gap in care for newborn babies in the care of the umbilical cord which is still wrapped in gauze, considering that the mother is still afraid that if the umbilical cord is not wrapped it will be exposed to urine and feces. It is recommended that midwives can improve comprehensive care in providing quality services for the health of mothers, children and the community.

Keywords: *Frequent Urination, Third Trimester Pregnant Women, Continuity of Care (COC).*