

## ABSTRAK

ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA PEREMPUAN “EJ” DI


PMB KS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SERIRIT I

TAHUN 2019

Dalam suatu keluarga, kehamilan merupakan suatu hal yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Kehamilan dengan kondisi yang fisiologis tidak selalu akan berakhir fisiologis. Dalam prosesnya terdapat kemungkinan keadaan patologis. Adapun masalah yang dapat terjadi dari kehamilan yang bersifat fisiologis menjadi kehamilan yang mengarah patologis. Pada proses persalinan dimana lahirnya bayi normal yang dilahirkan langsung menangis spontan, gerak aktif, tidak mengalami kelainan apapun. Bayi baru lahir memerlukan perawatan yang terpenting yaitu tetap menjaga suhu tubuhnya yang kemudian disusul dengan pengeluaran plasenta. Setelah pengeluaran plasenta, ibu dikatakan dalam masa nifas yang merupakan masa dari satu jam setelah kelahiran plasenta sampai 6 minggu atau 42 hari. Pemulihan kondisi pada masa nifas juga dapat mempengaruhi lamanya dalam menentukan serta pemasangan alat kontrasepsi pasca bersalin. Jika pada saat hamil ibu tidak mengetahui kondisinya, apakah ibu mengalami suatu komplikasi atau tidak maka hal itu akan mempengaruhi proses persalinannya dan akan menghambat hingga ke pemilihan alat kontrasepsi. Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah persalinan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa lebih dari 90% kematian ibu disebabkan oleh komplikasi obstetri, yang sering tidak dapat diramalkan pada saat kehamilan.

Kebanyakan komplikasi itu terjadi pada saat atau sekitar persalinan. Dimana jenis penelitian yang digunakan pada studi kasus ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Metode asuhan yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi. Subjek studi kasus adalah perempuan "EJ" G<sub>1</sub>P<sub>0</sub>A<sub>0</sub> UK 37 Minggu 3 Hari Preskep  $\cup$ -Puki Janin Tunggal Hidup Intra Uteri. Dalam proses asuhan kebidanan komprehensif pada perempuan "EJ" didapatkan hasil selama kehamilan trimester III ibu mengalami keluhan sakit pinggang, proses persalinan ibu normal, bayi dalam keadaan sehat. Dan dalam masa nifas ibu tidak mengalami masalah serta ibu memutuskan untuk menggunakan KB suntik 3 bulan setelah 42 hari masa nifas. Selama proses asuhan kebidanan komprehensif didapatkan keadaan ibu dan bayi tidak ditemukan adanya kesenjangan pada asuhan.

Kata Kunci : Kehamilan, Persalinan, Nifas.



## ABSTRACT

### OBSTETRICIAN COMPREHENSIVE IN WOMEN “EJ” IN PMB “KS” IN THE WORKING AREA OF PUSKESMAS SERIRIT I YEAR 2019

In a family, pregnancy is something that is expected by every married couple. Pregnancy with a physiological condition does not always end physiologically. In the process there is a possibility of a pathological state. The problems that can occur from a physiological pregnancy into a pathological pregnancy. In the process of childbirth in which the birth of a normal baby who was born immediately cried spontaneously, active motion, did not experience any abnormalities. Newborns need the most important treatment, which is to maintain their body temperature, which is then followed by the removal of the placenta. After removal of the placenta, the mother is said to be in the puerperium which is a period of one hour after birth of the placenta for up to 6 weeks or 42 days. Recovery of conditions during the puerperium can also affect the duration in determining and installation of postpartum contraception. If during pregnancy the mother does not know her condition, whether the mother has a complication or not, it will affect the delivery process and will hinder the selection of contraceptives. Efforts to reduce the MMR should be focused on the direct cause of maternal death that occurs 90% at the time of delivery and immediately after delivery. This is based on the fact that more than 90% of maternal deaths are caused by obstetric complications, which are often unpredictable during pregnancy. Most of the complications that occur during or around delivery. Where

the type of research used in this case study is the type of descriptive research, which is a study conducted with the main objective to describe or describe a phenomenon that occurs in society. The care methods used are interviews and observation. The subject of the case study was the female "EJ" G1P0A0 UK 37 Week 3 Day Preskep  $\cup$  Puki Single Fetus Intra-Uteric Life. In the process of comprehensive midwifery care for women "EJ" the results obtained during the third trimester of pregnancy mothers experience complaints of back pain, normal delivery of the mother, the baby in good health. And in the puerperium mother did not experience problems and the mother decided to use family planning injections 3 months after 42 days of childbirth. During the comprehensive midwifery care process, maternal and infant conditions were found that there were no gaps in care.

Keywords : Pregnancy, Childbirth, Postpartum.

