

# RECONSTRUCTION OF PROTO SAMBORI-TETA

By

Komang Saras Prabangkara

1712021006

English Language Education, Language and Art Faculty

Ganesha University of Education

Email: [sarasprabangkara99@gmail.com](mailto:sarasprabangkara99@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan dari studi ini yaitu untuk mendeskripsikan wujud bahasa proto sari Sambori dan Teta yang dilihat dari pendekatan bawah ke atas (*bottom-up*) dan atas ke bawah (*top-down*). Desain study ini adalah penelitian kualitatif deskripsi. Studi ini menggunakan 3 informan dari masing-masing desa Sambori dan Teta. Selain itu, data-data diperoleh dengan menggunakan 3 instrumen yaitu daftar kosakata Swadesh dan Holle, gambar, dan juga perekam suara. Lalu, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan rekonstruksi bawah ke atas (*bottom-up*) dan atas ke bawah (*top-down*). Hasil dari studi ini menunjukkan sebagai berikut: 1) Terdapat sejumlah 1237 wujud etimon dari Proto Sambori-Teta yang direkonstruksi dengan menggunakan rekonstruksi bawah ke atas (*bottom-up*); 2) Terdapat sejumlah 707 wujud etimon dari Proto Sambori-Teta yang dipantulkan dari Proto-Austronesia sebagai hasil dari rekonstruksi atas ke bawah (*top-down*). Terlebih lagi, etimon tersebut dibagi menjadi 16 wujud yang sama, 417 wujud yang mirip, dan 274 wujud yang berbeda. Selain itu, terdapat 534 etimon PSm-Te dari bawah ke atas tidak ditemukan kata kognatnya di kamus proto Austronesia *Finderlist Dictionary*.

**Kata kunci:** Proto-Austronesia; Rekonstruksi bawah ke atas (*bottom-up*); Rekonstruksi atas ke bawah (*top-down*)

## Abstract

The aim of this study was to describe the form of proto language of Sambori and Teta seen from bottom-up and top-down approaches. This study was descriptive qualitative research. This study used 3 informants of both Sambori and Teta dialects. In addition, the data were obtained by using 3 instruments, namely wordlist of Swadesh and Holle, picture and tape recorder. The data were analyzed by using bottom-up and top-down reconstruction approaches. The results of the study show that: 1) There were 1237 etymons of Proto Sambori Teta which were reconstructed by using bottom-up reconstruction; 2) There were 707 etymons of Proto Sambori Teta which were reflected into Proto-Austronesia as the result of top-down reconstruction. These etymons of Proto Sambori Teta were divided into 16 the same forms, 417 similar forms, and 274 different forms. In addition, there were 534 etymons of PSm-Te (*bottom-up*) the cognates of which were not found in the finderlist dictionary of PAN.

**Keywords:** *Proto-Austronesia; Bottom-up Reconstruction; Top-down Reconstruction*