

## **Abstrak**

### **Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Perempuan “SW” di PMB “IP” Wilayah Kerja Puskesmas Sawan I Tahun 2021**

Pada kehamilan Trimester III akan mengalami perubahan adaptasi psikologis salah satunya perubahan yang paling sering terjadi pada ibu hamil TM III yaitu rasa cemas pada kehamilan menjelang proses persalinan. Setelah melakukan studi kasus pendahuluan di PMB "IP" dengan menggunakan skala *HRSA* didapatkan ibu hamil trimester III pada primigravida mengalami kecemasan. Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif dimulai sejak kehamilan trimester III sampai 2 minggu masa nifas. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada subjek penelitian Perempuan "SW" dengan usia kehamilan 38 minggu. Setelah melakukan asuhan pada Perempuan "SW" didapatkan hasil bahwa ibu mengalami kecemasan tingkat ringan pada kehamilan trimester III yang berlanjut sampai proses persalinan sehingga memberikan dampak pada persalinan yaitu IMD tidak berhasil dilakukan dikarenakan ibu merasa kelelahan untuk segera menyusui bayinya sehingga IMD hanya berlangsung 15 menit dan belum mencapai putting susu ibu. Pada masa nifas dan bayi baru lahir berjalan normal tanpa ada penyulit. Simpulan yang dapat ditarik dari kasus tersebut tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan aktual di lapangan ketika melakukan asuhan.


**Kata kunci : Kehamilan, Trimester III, Kecemasan**

## **Abstract**

### **Comprehensive Midwifery Care For "SW" Women in "IP" PMB Sawan I Public Health Working Area Year 2021**

In the third trimester of pregnancy, there will be changes in psychological adaptation, one of the changes that most often occur in TM III pregnant women, namely anxiety in pregnancy before the delivery process. After conducting a preliminary case study at PMB "IP" using the *HRSA* scale, it was found that pregnant women in the third trimester of primigravida experienced anxiety. This case study aims to provide comprehensive midwifery care starting from the third trimester of pregnancy to 2 weeks of the puerperium. The type of research used is descriptive with a case study approach on the research subject of "SW" women with a gestational age of 38 weeks. After caring for the "SW" woman, it was found that the mother experienced mild anxiety in the third trimester of pregnancy which continued until the delivery process so that it had an impact on delivery, namely the IMD was not successful because the mother felt tired to immediately breastfeed her baby so that the IMD only lasted 15 minutes and has not reached the mother's nipple. During the puerperium and newborns walk normally without any complications. The conclusion that can be drawn from this case is that there is no gap between theory and actual in the field when providing care.

**Keywords:** Pregnancy, Third Trimester, Anxiety



**UNDIKSHA**