

Abstrak

Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Perempuan “LS” Di PMB “MD” Di Wilayah Kerja Puskesmas Negara I Tahun 2021

Perubahan fisiologis pada ibu hamil trimester III dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang sering terjadi pada ibu hamil TM III salah satunya yaitu sering kencing. Keluhan sering kencing merupakan akibat dari desakan rahim kedepan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh, gejala ini bisa timbul karena janin mulai masuk kerongga panggul dan menekan kembali kandung kemih sehingga menyebabkan sering kencing. Ibu hamil TM III yang mengalami ketidaknyamanan sering kencing diberikan asuhan kebidanan berkelanjutan (*Continuity of Care*) yaitu pemberian asuhan kebidanan yang dimulai sejak kehamilan, bersalin, bayi baru lahir hingga nifas 2 minggu.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang berlokasi di PMB “MD” di wilayah kerja Puskesmas Negara I yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2021, dengan subjek penelitian yaitu perempuan “LS” UK \geq 36 minggu. Teknik pengumpulan data pada studi kasus ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Asuhan kebidanan berkelanjutan yang diberikan pada perempuan “LS” dari masa kehamilan, persalinan, hingga nifas berjalan dengan fisiologis dan tidak terjadi komplikasi. Asuhan kebidanan pada perempuan “LS” diberikan sesuai dengan teori yang ada serta tidak ada kesenjangan.

Kata kunci: *Ibu hamil Trimester III, Continuity of Care, sering kencing*

Abstract

Comprehensive Midwifery Care For "LS" Women In "MD" PMB Negara I Public Health Working Area 2021

Physiological changes in third trimester pregnant women can cause discomfort. One of the discomforts that often occurs in TM III pregnant women is frequent urination. Complaints of frequent urination are a result of the pressure of the uterus forward causing the bladder to feel full quickly, this symptom can arise because the fetus begins to enter the pelvic cavity and presses back on the bladder, causing frequent urination. TM III pregnant women who experience frequent urination are given continuous midwifery care (*Continuity of Care*), namely the provision of midwifery care starting from pregnancy, childbirth, newborns to 2 weeks postpartum.

This research method uses a descriptive research method with a case study approach located in PMB "MD" in the working area of the State Health Center I which was carried out from April to June 2021, with the research subject being female "LS" UK 36 weeks. Data collection techniques in this case study were conducted by interview, observation, physical examination, and documentation studies. Continuing midwifery care provided to "LS" women from pregnancy, delivery, to postpartum was physiological and there were no complications. Midwifery care for "LS" women is provided according to existing theory and there are no gaps.

Keywords: *Third trimester pregnant women, Continuity of Care, frequent urination*

