

## ABSTRAK

### **Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Perempuan “SW” di PMB “WE” Wilayah Kerja Puskesmas Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2021**

**Ni Wayan Ezy Darmayanti<sup>1</sup>, Luh Mertasari<sup>2</sup>, Ni Nyoman Ayu Dwi Astini<sup>3</sup>  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja**

**<sup>1</sup>[ezydarmayanti@gmail.com](mailto:ezydarmayanti@gmail.com),<sup>2</sup>[luh.mertasari@undiksha.ac.id](mailto:luh.mertasari@undiksha.ac.id),<sup>3</sup>[ayu.dwi.astini@undiksha.ac.id](mailto:ayu.dwi.astini@undiksha.ac.id)**

Selama kehamilan TM III ada beberapa ketidaknyamanan yang dirasakan. Salah satu ketidaknyamanan pada ibu hamil TM III adalah sering kencing. Pada masa kehamilan, terjadinya hemodilusi yang menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Selain itu, pada masa kehamilan TM III gejala bisa timbul atau terjadi karena janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kemih. Tekanan yang diberikan pada kandung kemih oleh turannya kepala janin yang sudah memasuki pintu atas panggul yang menyebabkan keinginan berkemih menjadi lebih sering. Penulis mengambil data dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dokumentasi dan studi kepustakaan. Subyek dalam asuhan ini adalah Perempuan “SW” G2P1A0 UK 36 minggu 4 hari dengan keluhan sering kencing di PMB “WE” di Wilayah Kerja Puskesmas Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Hasil penelitian diperoleh diagnosa yaitu asuhan kebidanan secara komprehensif pada perempuan “SW” usia 24 tahun G2P1A0 usia kehamilan 36 minggu 4 hari, selama kehamilan trimester III, bersalin, bayi baru lahir, sampai 2 minggu masa nifas. Selama kehamilan trimester III dengan keluhan sering kencing dan telah dilakukan penatalaksanaan sesuai dengan teori sehingga keluhan dapat teratasi. Ketidaknyamanan sering kencing merupakan keluhan yang bersifat fisiologis dan lazim terjadi pada ibu hamil TM III, pada persalinan, masa nifas, hasil yang didapatkan dalam batas normal dan tidak terdapat kesenjangan dan pada bayi baru lahir antara teori dengan praktek terdapat kesenjangan. Sehingga, kesimpulannya yaitu pada kehamilan TM III dan bayi baru lahir terdapat kesenjangan antara teori dengan praktek dilapangan.

**Kata Kunci : Asuhan komprehensif, Sering Kencing, Trimester III**

## ABSTRACT

### **Comprehensif Midwifery Care For Women “SW” in PMB “WE” Working Area of Puskesmas Rendang Karangasem Regency in 2021**

**Ni Wayan Ezy Darmayanti<sup>1</sup>, Luh Mertasari<sup>2</sup>, Ni nyoman Ayu Dwi Astini<sup>3</sup>**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**  
**Singaraja**

<sup>1</sup>ezydarmayanti@gmail.com, <sup>2</sup>luh.mertasari@undiksha.ac.id, <sup>3</sup>ayu.dwi.astini@undiksha.ac.id

During pregnancy TM III there is some discomfort felt. One of the discomforts in pregnant women TM III is frequent urination. During pregnancy, the occurrence of hemodilution causes water metabolism to be smooth. In addition, during pregnancy TM III symptoms can arise or occur because the fetus begins to enter the pelvic cavity and repress the bladder. The pressure exerted on the bladder by the drop of the head of the fetus that has entered the upper door of the pelvis causes the urination to become more frequent. The authors took the data by interview, observation, physical examination, documentation and literature studies. The subject in this care is Women "SW" G2P1A0 UK 36 weeks 4 days with complaints of frequent urination in PMB "WE" in the Working Area of Puskesmas Rendang Karangasem District in 2021. The results of the study obtained a comprehensive diagnosis of midwifery care in women "SW" age 24 years G2P1A0 gestational age 36 weeks 4 days, during pregnancy trimester III, maternity, newborn, up to 2 weeks nifas period. During pregnancy trimester III with frequent complaints urinating and has been carried out in accordance with the theory so that complaints can be resolved. Discomfort often urinate is a physiological complaint and is common in pregnant women TM III, in childbirth, nifas period, results obtained within normal limits and there is no discomfort and in newborns between theory and practice there are gaps. Thus, the conclusion is that in TM III pregnancy and newborns there is a gap between theory and practice in the field.

**Keywords: Comprehensive Care, Frequent Urination, Trimester III**