

ABSTRAK

Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Perempuan “LM” Di PMB “MM” Wilayah Kerja Puskesmas II Denpasar Utara

Oleh :

Ni Luh Gede Damayanti, niluhgededamayanti1999@gmail.com
Prodi DIII Kebidanan
Fakultas kedokteran
Universitas Pendidikan Ganesha

Adaptasi fisiologis yang dialami ibu hamil berbeda-beda tergantung pada trimester kehamilan. sering kencing merupakan keluhan yang sering di alami pada ibu hamil trimester III, keluhan sering kencing ini di akibatkan adanya tekanan dari rahim kedepan karena janin sudah masuk ke rongga panggul dan menekan kandung kemih yang menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan terjadi keinginan untuk berkemih. Keluhan sering kencing ini adalah hal yang fisiologis terjadi pada ibu hamil yang sudah memasuki trimester III, keluhan sering kencing ini tidak terlalu berbahaya bagi kehamilan, walaupun demikian masalah ini juga harus di perhatikan namun tetap memerlukan perhatian khusus dengan memberikan asuhan secara berkesinambungan (*Continuity of Care*), apabila hal tersebut di lakukan secara berkepanjangan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada ibu, kebiasaan menahan buang air kecil dapat menyebabkan terjadinya infeksi saluran kencing (ISK) apabila hal tersebut di biarkan akan mengakibatkan persalinan preterm, pertumbuhan janin terhambat bahkan janin lahir mati . Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi kasus yang berlokasi di PMB “MM” di wilayah kerja puskesmas II denpasar utara yang di laksanakan dari bulan mei sampai dengan bulan juni 2021. subyek penelitian yaitu perempuan “LM” UK 38 minggu 2 hari. Teknik pengumpulan data pada studi kasus ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Setelah diberikan asuhan secara berkesinambungan keluhan sakit perut hilang timbul yang dialami perempuan “LM” diberikan KIE penyebab dan cara mengatasi keluhan sering kencing namun sudah mengetahui penyebabnya. Proses persalinan terjadi secara spontan dengan laserasi grade II , bayi lahir spontan belakang kepala sudah di lakukan IMD, masa nifas perempuan “LM” dengan nifas normal serta neonatus normal. Kesimpulan dari asuhan tidak di temukan kesenjangan antara teori dengan asuhan yang di berikan.

Kata Kunci: *Sering Kencing,komprehensif, contunity of care*

ABSTRACT

Comprehensive Midwifery Care for Women “LM”

At PMB "MM" the Working Area of Puskesmas II North Denpasar

By :

Ni Luh Gede Damayanti, niluhgededamayanti1999@gmail.com

Midwifery DIII Study Program

Medical School

Ganesha University of Education

Physiological adaptations experienced by pregnant women vary depending on the trimester of pregnancy. Frequent urination is a complaint that is often experienced by pregnant women in the third trimester, complaints of frequent urination are caused by pressure from the uterus ahead because the fetus has entered the pelvic cavity and presses the bladder which causes the bladder to feel full quickly and the desire to urinate occurs. Complaints of frequent urination are physiological things that occur in pregnant women who have entered the third trimester, complaints of frequent urination are not too dangerous for pregnancy, although this problem must also be considered but still requires special attention by providing continuous care (Continuity of Care). If this is done for a long time, it can cause discomfort to the mother, the habit of holding back urination can cause urinary tract infections (UTI) if this is allowed to result in preterm delivery, stunted fetal growth and even stillbirth. The type of research used is descriptive with a case study method located at PMB "MM" in the working area of Puskesmas II, North Denpasar, which is carried out from May to June 2021. The research subject is female "LM" UK 38 weeks 2 days. Data collection techniques in this case study were conducted by using interviews, observation, physical examination, and documentation studies. After being given continuous care, the complaint of intermittent abdominal pain experienced by the woman "LM" was given KIE the cause and how to overcome the complaint of frequent urination but already knew the cause. The delivery process occurred spontaneously with a grade II laceration, the baby was born spontaneously behind the head and had an IMD done, the puerperal period of "LM" women with normal postpartum and normal neonates. The conclusion of the upbringing did not find a gap between the theory and the care provided.

Keywords: Frequent urination, comprehensive, continuity of care

UNDIKSHA